

HORTUS CLIFFORTIANUS

Plantas exhibens

QUAS

In Hortistam VIVIS quam SICCIS,
HARTECAMPI in Hollandia,

COLUIT

VIR NOBILISSIMUS & GENEROSISSIMUS

GEORGIUS CLIFFORD

JURIS UTRIVSQUE DOCTOR,

Reductis Varietatibus ad Species,

Speciebus ad Genera,

Generibus ad Classes,

Adjectis Locis Plantarum natalibus
Differentiisque Specierum.

Cum TABULIS ÆNEIS.

AUCTORE

CAROLO LINNÆO,

Med. Doct. & Ac. Imp. N. C. Soc.



AMSTELÆDAMI. 1737.



Hippomanes & *Hippomane* vocabulum græcum, receptum ad exprimendum quid omnium maxime abominabile (per metaphoram ab *Equis*) quod itidem verbum etiam olim in *Botanicis* usitatum. Assumsi itaque hoc ubi nominarem vegetabile quoddam, quo tetrius nullum. Nullum enim etiamnum umquam innotuit vegetabile hocce magis venenatum, si umquam fides adhibenda peregrinatoribus omnibus *Americæ*, totque millenis cladibus, quas hæc arbor in sola *Surinama* commiserit. Lactescens est, & lacte forte omnia agit, ut reliquæ lactescentes plantæ. Caulis glaber, folia nitent glabritie.

D A L E C H A M P I A. g. pl. 926.

I. DALECHAMPIA.

Dalechampia scandens, lupuli foliis, fructu hispido tricocco. *Plum. gen.* 17.

Lupulus folio trifido, fructu tricocco & hispido. *Plum. amer.* 89. t. 101.

Convolvulo-tithymalus. *Boerb. lugdb.* 2. p. 268. descr.

Crescit in insula *Martinicana* & *Surinama*, unde semina, e quibus tenella a verme, licet lactescens, corrosa perit planta.

Consecrata memoriæ *Jacobi Dalechampi Historia Lugdunensi* claro.

H E R N A N D I A. g. pl. 925.

I. HERNANDIA.

Hernandia amplo hederæ folio umbilicato. *Plum. gen.* 6.

Umbilicato folio arbor philippensis Balanti dicta. *Pet. gaz.* t. 43. f. 1?

Nux vesicana oleosa, foliis umbilicatis ex insula *barbadensi*. *Pluk. alm.* 266. t. 208. f. 1?

Nux zeylanica, umbilicatis foliis. *Kigg. beaum.* 31. *Burm. zeyl.* 171?

Arbuscula exotica, foliis umbilicatis *Pada Kelangu*, nuculam nuculæ indicæ sonoræ *Johannis Bauhini* similem ferens. *Breyn. prod.* 2. p. 20?

Crescit in *America*; in *Barbados*, in insulis *Philippinis* &c. Et certe singulare, si hæc arbor, cujus facies tota *Americana*, etiam *Zeylanensis* sit.

Habemus specimen ex *America* lectum, cujus singulum folium vix pyri magnitudinem attingat, at planta nostra viva folia fere pedalia promit. Caulis inferne rugosus, sulcis fissus; rami teneriores, læves, virides; Folia ovata, acuminata, glabra, superne viridia nitida, subtus pallide viridia. Petiolus inseritur disco folii supra basin, hinc folium peltatum fit & discum superiorem extrorsum vertit, acumine deorsum nutans; ubi petiolus folio inseritur, ibi vasa purpurea umbilicum stellatum rubrum constituunt. Hinc collata foliorum magnitudine, nitore, situ, macula, evadit arbor adeo speciosa, nitida, superba & grata ut formosiores me nunquam conspexisse fatear. Adhuc in Horto non floruit; fructus est lignosus, oblongo campanulatus, collo coarctatus, tubo subrotundo, limbo patenti-concavo. Nucleus intra tubum, qui per collum angustius, exire nequit. Hinc fructus in arbore pendulus parumque sonorus evadit.

Consecrata fuit *Francisco Hernando*, ex *historia pl. mexicanarum* claro.

H O U S T O N I A N A.

C O N O C A R P U S. g. pl. 929.

I. CONOCARPUS.

Alnus maritima myrtifolia coriariorum *Buttonwood bermudensibus* vulgo. *Pluk. alm.* 18. t. 240. f. 3.

Alni fructu, laurifolia arbor maritima. *Sloan. flor.* 135. *hist.* 2. p. 18. t. 161. f. 2. *Raj. dendr.* 11.

Frutex innominatus 2^{dus}. *Marcgr. bras.* 76. fig. inferior.

Rudbeckia. *Houft. mss.*

Crescit in arenosis maritimis *Bermudensibus* & *Jamaicensibus* prope passage fort & old harbour copiose.

Folia lanceolata; strobili subrotundi: squamis reflexis, imbricatis, incanis, villosis, quarum lateri (non margini) vel disco affiguntur flosculi singulari methodo.

R A N D I A. g. pl. 390.

I. RANDIA. Houft. mss.

Lycium majus americanum, jasmimi flore, foliis subrotundis lucidis. *Pluk. alm.* 234. t. 97. f. 6.

Cacao affinis frutex spinosus, lycii facie, jasmimi flore albo, fructu in dispartes particulas inter se arte hærentes diviso. *Sloan. flor.* 135. *hist.* 2. p. 18. t. 161. f. 1. *Raj. dendr.* 82.

Crescit in *Jamaica*.

Dixit hanc *Houstonus* a *Johanne Randio Pharmacopæo anglo*.



HERNANDIA. *Hort. Cliff.* 485. *sp. I.*

- a *Caulis summa pars quadruplo tenerior quam in ipsa arbore.*
- b *Umbilicus purpurascens foliorum peltatorum.*
- c *Ramulus.*

Campanula pyramidata altissima. *Tournef. inst.* 109.

Campanula major lactescens. *Lob. hist.* 177. *Morif. hist.* 2. p. 452. f. 5. t. 1. f. 1. *Boerb. lugdb.* 1. p. 248.

Rapunculus hortensis, latiore folio, seu Pyramidalis. *Baub. pin.* 3. p. 93.

Pyramidalis lævis. *Baub. hist.* 2. p. 808.

Crescendi locum apud autores non observo, adeo tamen in hortis vulgaris est, ut cuique rustico nota sit, & Londini ubique in mercatorum discis ornamenti causa in olla florentem vidimus.

7. CAMPANULA foliis lineari-lanceolatis crenatis, caule longissimo simplici, floribus raris.

Campanula perficæfolia. *Lob. hist.* 177. *Morif. hist.* 2. p. 452. f. 5. t. 1. f. 2.

Campanula perficæfolia lobelli, flore cæruleo. *Boerb. lugdb.* 1. p. 248.

Campanula perficæ folio. *Chuf. hist.* 2. p. 171.

Campanula angustifolia cærulea. *Baub. hist.* 2. p. 803.

Rapunculus perficifolius, magno flore. *Baub. pin.* 93.

α Campanula perficæfolia, flore cæruleo pleno. *Tournef. inst.* 111.

β Campanula perficæfolia, flore albo. *Tournef.*

γ Campanula perficæfolia, flore albo pleno. *Tournef.*

Crescit ad acidulas Spadenses in Germania inferiore, in collibus Genevæ vicinis. In Alsatia inter Zultz & Zennam urbes; in Suecia Wexioniæ inque monte Oesterby, in Finlandia Bicerneburgi.

8. CAMPANULA foliis radicalibus lanceolato-ovalibus, caule ramosissimo patulo

Campanula radice efculenta, flore cæruleo. *Herm. lugdb.* 107. *Boerb. lugdb.* 1. p. 248.

Rapunculus efculentus. *Baub. pin.* 92. *Morif. hist.* 2. p. 455. f. 5. t. 2. f. 13.

Rapunculus vulgaris campanulatus. *Baub. hist.* 2. p. 795.

Rapunculum. *Dod. pempt.* 165.

α Campanula radice efculenta, flore candidante. *Tournef. inst.* 111.

Crescit in aggeribus & arvis non cultis in Anglia, Monspeliis, Basilea

9. CAMPANULA foliis radicalibus reniformibus, caulinis linearibus. *Fl. lapp.* 83.

Campanula minor rotundifolia vulgaris. *Baub. pin.* 93.

Campanula minor rotundifolia. *Lob. hist.* 178. *Dalech. hist.* 827.

Campanula minor alpina, rotundioribus imis foliis. *Chuf. hist.* 173.

Campanula vulgaris minor, foliis imis rotundioribus sinuatis non serratis. *Morif. hist.* 2. p. 456. f. 5. t. 2. f. 17.

Campanula sylvæstris minima. *Dod. pempt.* 167.

α Campanula minor rotundifolia vulgaris, floribus candidis. *Tournef. inst.* 111.

Crescit in agrorum marginibus vulgaris per Europam, in Suecia autem copiosissima.

10. CAMPANULA foliis hastatis dentatis, caule determinate folioso. *vide tab. VIII.*

Campanula canariensis, atriplicis folio, tuberosa radice. *Tournef. inst.* 109.

Campanula canariensis regia seu Medium radice tuberosa, foliis sinuatis cæsius, atriplicis æmulis ternis circum caulem ambientibus, flore amplo pendulo colore flammeo rutilante. *Pluk. alm.* 76. t. 276. f. 1.

Crescit in insulis Canariis.

11. CAMPANULA caule simplicissimo, foliis amplexicaulibus.

Campanula pentagonia pertoliata. *Morif. hist.* 2. p. 457. f. 5. t. 2. f. 23. *Boerb. lugdb.* 1. p. 248. *Bocc. mus.* 1. t. 5. f. 8. (minima.)

Rapunculum minimum rotundifolium verticillatum, flore purpureo. *Barr. rar.* t. 1133.

Speculum veneris perfoliatum seu Viola pentagonia perfoliata. *Raj. hist.* 743.

Crescendi naturalem locum non addit inventor, videtur natione Italæ.

Distinctissima est hæc species a congeneribus: Caule communiter sine ramis erecto. Foliis cordatis, amplexicaulibus, dentato-crenatis, alternis. Floribus tribus communiter sessilibus, intra singulam folii alam.

12. CAMPANULA caule dichotomo, foliis sessilibus utrinque bidentatis.

Campanula minor annua, foliis incis. *Morif. hist.* 2. p. 458. f. 5. t. 3. f. 25.

Rapunculus minor, foliis incis. *Baub. pin.* 92.

Erini five Rapunculi minimum genus. *Col. phyt.* 28.

Erinos fabii columnæ minor. *Baub. hist.* 2. p. 799. *Raj. hist.* 743.

Alfine oblongo folio serrato, flore cæruleo. *Baub. hist.* 2. p. 367.

Crescit in muris & siccioribus Messanæ & Monspeli.

13. CAMPANULA caule ramoso, foliis ovatis oblongis crenatis.

Campanula arvensis erecta. *Herm. lugdb.* 108. *Boerb. lugdb.* 1. p. 248.

Speculum flore cæruleo arvense. *Rupp. jen.* 25.

Speculum veneris. *Raj. hist.* 742.

Onobrychis arvensis vel Campanula arvensis erecta. *Baub. pin.* 215.

Avicularia sylvii quibusdam. *Baub. hist.* 2. p. 800.

α Campanula arvensis procumbens. *Tournef. inst.* 112.

β Campanula seu Viola pentagonia, folio oblongo latiori. *Morif. bles.* 244.

γ Campanula arvensis erecta, flore albo. *Tournef.*

Crescit inter segetes in agris Galliæ, Italiæ, Germaniæ, &c.



CAMPANULA foliis hastatis dentatis, caule determinate folioso. *Hort. Cliff.* 65. sp. 10.
Ramulus cum Flore. Folia opposita sunt.